

**Cas diagnostiqués de LTI et de MG dans les laboratoires de pathologie animale du MAPAQ pour la période 2001-2010  
(Inclus les troupeaux commerciaux et les élevages de basse-cour)**

<b>Type d'oiseaux</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
Poulets à chair	5 LTI	4 LTI		2 LTI			1 LTI	4 LTI	3 LTI	11 LTI
Reproducteurs à chair en production	1MG									
Reproducteurs à chair de remplacement	1 LTI	1 LTI								
Pondeuses commerciales en production				1 LTI Lié à la vaccination						
Pondeuses commerciales de remplacement	3 LTI	2 LTI	1 LTI Lié à la vaccination		1 LTI Lié à la vaccination			1 LTI	1 LTI	1 LTI
Dindes								1 MG	1 MG	
<b>Total</b>	<b>9 LTI 1 MG</b>	<b>7 LTI 0 MG</b>	<b>1 LTI 0 MG</b>	<b>3 LTI 0 MG</b>	<b>1 LTI 0 MG</b>	<b>0 LTI 0 MG</b>	<b>1 LTI 0 MG</b>	<b>5 LTI 1 MG</b>	<b>4 LTI 1 MG</b>	<b>12LTI 0 MG</b>
Basse-cour et autres	2 LTI	2 LTI	1 LTI	3 LTI	3 LTI	2 LTI		2 LTI 1 MG	1 LTI 2 MG	5 LTI 3 MG

**Cas diagnostiqués de LTI et de MG dans les laboratoires de pathologie animale du MAPAQ pour la période 2010-2020  
(2 septembre 2016)  
(Inclus les troupeaux commerciaux et les élevages de basse-cour)**

Type d'oiseaux	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Poulets à chair	1 LTI	3 LTI	4 LTI	2 LTI						
Reproducteurs à chair en production			1 LTI			2 LTI				
Reproducteurs à chair de remplacement										
Pondeuses commerciales en production	1 LTI			1 LTI						
Pondeuses commerciales de remplacement	3 LTI Lié à la vaccination									
Dindes	1 MG			2 MG						
<b>Total</b>	<b>5 LTI 1 MG</b>	<b>3 LTI 0 MG</b>	<b>5 LTI 0 MG</b>	<b>3 LTI 2 MG</b>	<b>0 LTI 0 MG</b>	<b>2 LTI 0 MG</b>				
Basse-cour et autres	2 LTI 2 MG	1 LTI <sup>1</sup> 3 MG	1 LTI 5 MG <sup>2</sup>	1 LTI 7 MG <sup>3</sup>	5 LTI <sup>4</sup> 6 MG <sup>5</sup>	4 LTI <sup>6</sup> 6 MG <sup>7</sup>				

Source : MAPAQ

<sup>1</sup> Un cas de basse-cour a été diagnostiqué pour LTI et MG dans la même éclosion.

<sup>2</sup> Le même troupeau de basse-cour a été infecté trois fois par MG.

<sup>3</sup> Un cas implique un troupeau commercial de cailles.

<sup>4</sup> Trois cas de basse-cour ont été diagnostiqués pour LTI et MG dans la même éclosion, dont un cas implique un troupeau d'oiseaux de fantaisie.

<sup>5</sup> Trois cas de basse-cour ont été diagnostiqués pour LTI et MG dans la même éclosion. Quatre cas de basse-cour ont été diagnostiqués pour MG et MS dans la même éclosion, dont un cas implique un troupeau d'élevage commercial de dindons sauvages. Un cas de basse-cour a été diagnostiqué pour LTI, MG et MS dans la même éclosion.

<sup>6</sup> Deux cas de basse-cour ont été diagnostiqués pour LTI et MG dans la même éclosion.

<sup>7</sup> Quatre cas de basse-cour ont été diagnostiqués pour MG et MS dans la même éclosion.